

Comment utiliser Affirm et Proclaim en arboriculture ?

Arboriculture
21.07.2016



Affirm et Proclaim apportent un niveau d'efficacité régulier sur les lépidoptères menaçant vos vergers.

Leur mode d'action et leur souplesse de positionnement sont particulièrement intéressants pour lutter contre les différentes espèces de lépidoptères présentes au même moment dans vos vergers de pommiers, poiriers, abricotiers et pêchers. Découvrez nos conseils d'utilisation.

Positionnement d'Affirm et de Proclaim sur une génération

Le positionnement idéal d'[Affirm](#) ou de [Proclaim](#) sur les œufs se situe dans les quelques jours précédant le pic des éclosions.



Positionnement et recommandations sur pommier et poirier

Intervenir en tenant compte de l'historique de l'année précédente et des observations de l'année.

Cultures	Usages	Dose (kg/ha)	Positionnement et recommandations
Pommier, poirier	Carpocapse	2	Sur 1ère, 2ème ou 3ème génération, au début des éclosions. Cadence de 10 jours. Ne pas appliquer sur 2 générations successives. L'ajout d'un adjuvant mouillant permet d'améliorer l'efficacité en cas de forte pression.
	Tordeuse orientale du pêcher	2	Sur les générations estivales, dès le début des éclosions. Intervenir conjointement avec la protection contre le carpocapse.
	Tordeuse de la pelure : Capua , Pandemis , Podana , Eulia	2	Début des éclosions.
Pommier	Petite tordeuse des fruits (G. lobarzewskii)	2	Début des éclosions. Intervenir conjointement avec la protection contre le carpocapse.

Dans tous les cas, se limiter à trois applications par an.

Positionnement et recommandations sur pêcher et abricotier

Cultures	Usages	Dose (kg/ha)	Positionnement et recommandations
----------	--------	--------------	-----------------------------------

Pêcher Abricotier	Tordeuse orientale du pêcher	2	Sur toutes les générations : positionner en préventif, dès le début des éclosions. Cadence de 10-12 jours selon la pression.
	Petite mineuse (Anarsia)	2	Dès l'observation d'une attaque déclarée, 10-12 jours après le pic de vol de 1ère génération ou dans le mois précédant la récolte avec une cadence de 10-12 jours.

Dans tous les cas, se limiter à trois applications par an.

Tags:

Dossier Affirm et Proclaim

Produits:

AFFIRM

PROCLAIM