

## **Drosophila suzukii : comment limiter l'extension des foyers ?**

Vigne

23.01.2015



**Prophylaxie, vendanges précoces, tri et mesures œnologiques sont à mettre en œuvre.**

**Objectif : stopper le développement de bactéries indésirables**

Il est recommandé de mettre en place des mesures prophylactiques simples consistant au vignoble à **limiter la vigueur de la vigne** ou encore **effeuiller la zone fructifère**, puis à **éliminer les grappes atteintes par tri manuel** et à les évacuer des parcelles au moment de la récolte. Il peut également être judicieux de vendanger plus tôt et si nécessaire d'intervenir en vinification en augmentant les doses de soufre ou encore en levurant plus rapidement, l'objectif étant de stopper le développement de bactéries indésirables.

Aucun insecticide n'est à ce jour spécifiquement homologué pour lutter contre cette drosophile sur vigne et la lutte insecticide est difficile compte tenu de la rapidité de reproduction de cette [drosophile](#) et de sa mobilité. La lutte chimique est possible en revanche contre les drosophiles communes avec [Karaté Zéon](#) jusqu'à 7 jours avant la récolte.

Lire l'article : [Drosophila suzukii : la mouche qui inquiète les vignerons](#)

**Antoine Schmitt, vigneron en Alsace, témoigne**

Au cours de la dernière semaine d'août 2014, à la faveur de journées chaudes avec un ciel couvert, j'ai pu observer sur des parcelles de Pinot Noir des baies creuses à l'intérieur desquelles on distinguait des larves. Vu de l'extérieur, les grappes semblaient saines ce qui laisse penser qu'il s'agissait de *Drosophila suzukii*. Nous faisons tous les ans un tri manuel, mais cette année nous avons dû être beaucoup plus vigilants du fait que cette drosophile colorait les baies d'une couleur légèrement marron, ce qui rendait la distinction un peu plus compliquée.

**Tags:**

pieds de vigne

**Produits:**

KARATE ZEON

**Cibles:**

*Drosophila suzukii*