

## ARMURE Betterave industrielle

Unpublished

Betterave industrielle

Traitement des parties aériennes

### Cercosporiose

Dose autorisée	Nombre maximum d'applications	Délai Avant Récolte (DAR)	Zone Non Traitée aquatique (en m)
0.6 L/ha	2/an	28 Jours.	5

**Dose préconisée:** 0.6 L/ha

**Période d'utilisation préconisée:** juillet aout septembre

### Oïdium

Dose autorisée	Nombre maximum d'applications	Délai Avant Récolte (DAR)	Zone Non Traitée aquatique (en m)
0.6 L/ha	2/an	28 Jours.	5

**Dose préconisée:** 0.6 L/ha

**Période d'utilisation préconisée:** juillet aout septembre

### Ramulariose

Dose autorisée	Nombre maximum d'applications	Délai Avant Récolte (DAR)	Zone Non Traitée aquatique (en m)
0.6 L/ha	2/an	28 Jours.	5

**Dose préconisée:** 0.6 L/ha

**Période d'utilisation préconisée:** juillet aout septembre

### Rouille

Dose autorisée	Nombre maximum d'applications	Délai Avant Récolte (DAR)	Zone Non Traitée aquatique (en m)
0.6 L/ha	2/an	28 Jours.	5

**Dose préconisée:** 0.6 L/ha

**Période d'utilisation préconisée:** juillet aout septembre

**préconisée:**

---

[L'échelle BBCH pour les betteraves](#)

---