

Comment utiliser Fytosave et Esdeaine en légumes sous serre ?

Légumes
27.01.2017



Avec Fytosave¹ et Esdeaine², sous serre, tomate, fraise, concombre et poivron se défendent contre l'oïdium...

- Utiliser seul ou en association, avec un fongicide conventionnel si nécessaire.
- Positionner en préventif. Relayer ou associer avec d'autres fongicides selon la pression parasitaire.
- Utiliser en séquence de 2 à 3 applications pour une mise en place optimale des défenses.
- Renouveler l'application tous les 7 à 10 jours selon la pression parasitaire.
- Appliquer de façon homogène sur les faces supérieures et inférieures des feuilles et sur les fruits.

Exemple de programmes en tomates sous serre

(ces types de programmes sont réalisables sur fraise, concombre et poivron)



Stratégie 1 : séquence de traitement préventive avant la période à risque



Stratégie 2 : séquence de traitement curative lors d'une attaque déclarée, intégrant un produit conventionnel



Stratégie 3 : séquence de traitement en alternance lors d'une attaque déclarée, en cours de stimulation.



¹ La solution FytoSave[®] remplace la solution Bastid[®] depuis janvier 2020

² La solution Esdeaine[®] remplace la solution Blason[®] depuis mai 2020

Tags:

Dossier Bastid et Blason

BASTID

BLASON

Produits:

ESDEAINE

FYTOSAVE

Cibles:

Oïdium de la tomate