

France

Published on *Syngenta France* (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Acariose de la vigne



Acariose de la vigne

Maladies

Au départ de la végétation, les attaques d'acariens, responsables de cette affection au niveau des bourgeons, provoquent l'arrêt de croissance de certains bourgeons. Les pousses de printemps sont alors rabougries et les entre-nœuds restent anormalement courts.

Sur les feuilles, les piqûres d'acariens provoquent de nombreuses tâches composées de nécroses brunes entourées de petites tâches claires souvent allongées. Le développement des tissus est inhibé provoquant de légères déformations de la feuille. Les feuilles apparaissent alors petites et frisées. La souche prend souvent un aspect buissonnant caractéristique.

Facteurs favorables

L'acariose de la vigne est une affection due à un acarien appelé le phytopte de l'acariose de la vigne.

Dégâts

- Dégâts importants sur les jeunes vignes.
- Sur les vignes âgées, des attaques répétées peuvent amener à un dépérissement progressif des ceps.
- Les pertes de récolte peuvent être importantes les années où le départ en végétation de la vigne est difficile et que la pullulation des phytoptes de l'acariose est importante.

Mesures prophylactiques

- Intervenir sur le phytopte responsable de la maladie.
-