

France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Cicadelle du maïs

---



Cicadelle du maïs  
*Zyginidia scutellaris*

**Insectes**

## **Adulte**

Insecte sauteur de 2 à 3 mm, vert bleuté.

## **Larve**

Semblable aux adultes, sans aile, blanche qui fonce au fur et à mesure.

## **Cycle de développement**

Plusieurs générations par an.

Les œufs sont pondus sous l'épiderme de la face inférieure des feuilles.

Les premières larves apparaissent vers la mi-juin ; leur nombre est croissant jusque mi-juillet et diminue à partir de la mi-août.

L'adulte hiverne sur des céréales cultivées ou des graminées sauvages.

Les étés secs sont les plus propices aux fortes infestations sur le maïs.

La cicadelle préfère les endroits ombragés (feuilles basses et intérieur des parcelles).

## **Dégâts**

Ils sont causés par les piqûres de larves et d'adultes donnant des petites taches blanches sur les feuilles.

Si les populations sont importantes, la feuille se dessèche et le rendement est affecté.

Le seuil de nuisibilité est atteint quand la feuille de l'épi commence à porter ces taches.

Les pertes de rendement peuvent atteindre 10 à 15%.

---