

France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Criocère de l'asperge



Criocère de l'asperge
Crioceris asparagi

Ravageurs

Adulte

Coléoptère de 6 mm, tête bleu brillant, antennes noires, thorax rouge orné de 2 points noirs. Elytres bleu brillant, bordés de rouge avec 2 rangées marginales de 3 taches blanches, pattes noires.

Œuf

2 mm de long, gris verdâtre foncé, fixé par l'un des pôles perpendiculairement au rameau.

Larve

En forme de petite limace de 7 mm, grise, tête et pattes noires, recouverte d'un mucus noirâtre.

Cycle de développement

2 générations par an.

Inféodé à l'asperge, l'adulte hiverne dans le sol et pond dès les premiers jours de mai. Les adultes de 1ère génération apparaissent en juin après une croissance larvaire de 15 à 20 jours et une nymphose dans le sol.

Les adultes de 2ème génération sont formés en juillet mais restent en diapause jusqu'au printemps suivant.

Dégâts

Les larves noires dévorent les jeunes pousses, ce qui réduit la photosynthèse.
Les adultes rongent les pointes d'asperges.

Mesures prophylactiques

Protéger uniquement les pousses tendres.
