



France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Lamier pourpre







Lamier pourpre

LAMPU

Lamium purpureum

Dicotylédones annuelles

Famille :

Lamiaceae

Synonyme ::

Ortie rouge, Pain-de-poulet

nuisibilité



++

Plantule

Cotylédons auriculés. Feuilles simples, arrondies, à dents espacées.

Plante adulte

Hauteur : 10 à 30 cm. Plante pubescente. Tiges diffuses, ascendantes, ramifiées en touffe, souvent rouge violet. Feuilles opposées arrondies à cordées, longuement pétiolées, crénelées. Nervures très nombreuses, réunies entre elles en réseau, donnant au limbe un aspect très gaufré. Feuilles supérieures à pétiole court et souvent teintées de rouge près de l'inflorescence, rapprochées en pyramide. Inflorescences : fleurs purpurines, groupées par 6 à 10, en 3 à 7 pseudo-verticilles étagés et très rapprochés en fin de tige. Fleurs nettement bilabiées avec une lèvre supérieure de 3,5 mm, duvetée et gonflée en demi-sphère, et une lèvre inférieure plus longue. Fruits : akènes de 2 à 2,5 mm, généralement gris et lisses, rarement à rides très fines.

Confusion possible

Lamier hybride (distinct par les bractées irrégulièrement et profondément incisées), Lamier amplexicaule (distinct par les bractées sessiles), Épiaires.

Particularités

Plante mellifère, astringente, vulnéraire, anti-catarrheuse et antiscrofuleuse. Plante fétide.
