

France

Published on *Syngenta France* (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Noctuelles terricoles



Noctuelles terricoles

Agrotis segetum et *Agrotis ipsilon*

Ravageurs

Synonyme ::

vers gris

Adulte

Papillon aux ailes antérieures brun foncé avec deux taches plus claires au centre ; ailes postérieures blanches chez le mâle, grises chez la femelle avec liseré noir sur le pourtour des ailes.

Larve

Chenille de 45 mm au dernier stade, de couleur grisâtre.

Cycle de développement

L'hivernation se fait dans le sol au dernier stade larvaire.

Les papillons volent en mai-juin (la nuit).

Les femelles pondent sur les plantes adventices ou à même le sol.

La chenille mange la nuit et se dissimule le jour au pied des plantes en s'enroulant sous une motte ou à une faible profondeur.

Ces noctuelles peuvent accomplir un trajet important et préfèrent les terres légères et bien exposées.

Dégâts

Les jeunes chenilles, après avoir rongé des adventices, s'attaquent aux cultures légumières voisines ainsi qu'aux betteraves, céréales, tabac, pommes de terre, vigne... dont elles dévorent le feuillage et sectionnent les pétioles.

Les attaques conduisent à la dépréciation de la production (légumes), voire à la destruction de la récolte.

Sur betteraves, elles occasionnent de graves dégâts en sectionnant le collet en période de sécheresse.

Mesures prophylactiques

Intervenir dès apparition des dégâts sur les larves jeunes.
