

France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Pucerons cendrés mauves



Pucerons cendrés mauves

Dysaphis pyri

Ravageurs

Aptère

2,5 à 3 mm, globuleux, brun mauve, recouvert d'une sécrétion pulvérulente blanchâtre.

Ailé

Antennes entièrement noires.

Cycle de développement

3 à 7 générations par an.

Les oeufs d'hiver sont déposés dans les crevasses des cicatrices des pétioles des fruits et éclosent à la fin du mois de mars.

Les jeunes fondatrices s'installent dans les boutons floraux qui viennent de s'ouvrir.

Les ailés apparaissent à partir de la 3ème génération et se reproduisent sur les gailllets.

Le retour s'effectue à partir d'octobre.

Dégâts

Les piqûres déforment les feuilles qui se boursoufflent, se tordent, se strient de blanc jaunâtre. Un miellat abondant coule et favorise l'installation de la fumagine.

Mesures prophylactiques

Les prédateurs et les parasites des pucerons sont nombreux : les syrphes, les coccinelles, les cécidomyies, les chrysopes, les hémérobies et les Hyménoptères.

La protection se réalise en 2 temps :

- traitements ovicides d'hiver
 - si présence au stade G-H, positionner le traitement juste après le contrôle.
-