

CALIBRA Maïs

Unpublished

Maïs

Désherbage

Dicotylédones annuelles

Dose autorisée	Nombre maximum d'applications	Délai Avant Récolte (DAR)	Zone Non Traitée aquatique (en m)
3.75 L/ha	1/an	90 Jours.	20

Dose préconisée: 2.5 L/ha

Période d'utilisation préconisée: Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet

Efficacité:

Moyennement efficace

Stade d'application préconisée: Prélèvement (en plein ou sur le rang en zone de vulnérabilité eau) ou post-levée précoce du maïs (avant 4 feuilles de la culture).

Spectre d'efficacité: [Download](#) 1.37 mo

Graminées annuelles

Dose autorisée	Nombre maximum d'applications	Délai Avant Récolte (DAR)	Zone Non Traitée aquatique (en m)
3.75 L/ha	1/an	90 Jours.	20

Dose préconisée: 2.5 L/ha

Période d'utilisation préconisée: Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet

Efficacité:

Efficace

Stade d'application préconisée: Prélèvement (en plein ou sur le rang en zone de vulnérabilité eau) ou post-levée précoce du maïs (avant 4 feuilles de la culture).

Spectre d'efficacité: [Download](#) 1.29 mo

[L'échelle BBCH pour le maïs](#)