

Reprise d'activité de la cicadelle dans le Sud-Ouest

Maïs

27.07.2021



Le climat désormais estival favorise la reprise d'activité de la cicadelle, observée dans les maïs occitans.

Avec le retour des températures de saison, l'activité de la [cicadelle bleue](#), *Zyginidia scutellaris*, reprend dans le Sud-Ouest. Pour le moment, sa présence reste modérée, mais le climat à venir s'annonce favorable au développement de ce ravageur commun du maïs. Pour rappel, la période de risque s'étale de l'apparition de la feuille de l'épi jusqu'à la fin des vols. Dès le stade 5 à 6 feuilles, des ponctuations blanches apparaissent sur les feuilles de la base de la plante. Les dégâts se propagent verticalement sur les étages supérieurs. Quand la feuille de l'épi porte des traces blanches et que les feuilles immédiatement inférieures sont desséchées, alors le seuil de risque est dépassé. Dans ce cas, Arvalis-institut du végétal préconise une ou deux interventions, avec un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes.

Découvrir les solutions Syngenta :

> [Karate® Xflow](#)

> [Karaté Zeon®](#)

Produits:

KARATE XFLOW

KARATE ZEON

Cibles:

Cicadelle du maïs